

Vacuna inactivada en emulsión oleosa

Para inmunización de aves contra infecciones
provocadas por *Fowladenovirus*



Composición

Posee los serotipos 4,
8b y 11.



Indicaciones

Cevac® IBH-Multi k está indicada para administrarse a aves sanas como ayuda en la prevención de la hepatitis a cuerpos de inclusión causada por adenovirus aviáres (FAdV). La vacunación de reproductores proporciona anticuerpos maternos a la progenie, como ayuda en la prevención de los signos, lesiones y mortalidad de la enfermedad.



Administración y dosis

- Cevac® IBH Multi k está indicada para la vacunación de aves sanas en la etapa de crianza a partir de las 3 semanas de edad y al menos 4 semanas antes del comienzo de la producción.
- Se recomienda la administración de 2 dosis; la primera entre las 8 y 10 semanas de edad y la segunda entre las 14 y 18 semanas de edad.
- Se administra por vía subcutánea o intramuscular a una dosis es de 0,5 ml por ave.



Advertencias y Almacenamiento

- Almacenar entre 2 °C y 8 °C.
- Proteger de la luz.
- No congelar
- La vacuna debe atemperarse en forma previa alcanzando 32-35°C al momento de la aplicación. Agitar en frasco en forma previa y durante su uso para asegurar la homogenización del contenido.
- En caso de que la vacuna sea inyectada accidentalmente al operador, es necesaria la atención médica inmediata.

Presentación

Frascos de 1.000 dosis / 500 ml.

Ceva Salud Animal S.R.L.

Camila O`Gorman 412, 12° Piso (C1107DED)
Buenos Aires - Argentina - Tel. +54 11 3724 7700

www.ceva.com.ar



@CevaConoSur



Ceva Salud Animal



@cevaavesconosur



Juntos, más allá de la Salud Animal